

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXX


綾部市立病院 化学療法
標準プロトコル／治療計画書 [No.372]
当レジメンの2022年度実施状況: 0件

胃 XELOX + zolbetuximab

<対象>

CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌 HER2陰性の患者に投与すること

<標準プロトコル>



capecitabine 朝 2week 夕

L-OHP (3W毎) ↑

zolbetuximab ↑

カペシタビン 4日間(分2・夕開始)連日経口投与、7日間休薬

<注意点>

GLOW試験では8コースを上限とし、以降はzolbetuximabのみの投与、または医師の裁量によりcapecitabine+zolbetuximabとして不応・不耐まで投与した。

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$BSA m²

<使用薬剤・投与量>

カペシタビン

体表面積	1回用量 / 1日用量
1.36m ² 未満	1,200mg(4錠)/回 / 2,400mg(8錠)/日
1.36~1.66m ² 未満	1,500mg(5錠)/回 / 3,000mg(10錠)/日
1.66~1.96m ² 未満	1,800mg(6錠)/回 / 3,600mg(12錠)/日
1.96m ² 以上	2,100mg(7錠)/回 / 4,200mg(14錠)/日

朝・夕
2回

オキサリプラチン 130mg/m² ⇨ mg

ゾルベツキシマブ 初回 800mg/m² ⇨ mg

2回目以降 600mg/m² ⇨ mg

<治療計画>

● 切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 8コース(以降はzolbetuximab、
またはcapecitabine+zolbetuximab)
 (治療に対して不応または不耐まで)

主治医 指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。

