

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXN


綾部市立病院 化学療法
標準プロトコール／治療計画書 [No.375]
当レジメンの2022年度実施状況: 0件

胃 XELOX + pembrolizumab

<対象>

- 治癒切除不能な進行・再発の胃癌
 - 下記に該当する使用方法については、本剤の有効性が確立されておらず、本剤の投与対象とならない
 - ・ HER2陽性の患者に対する投与
 - ・ 術後補助療法
- (令和6年5月17日改訂のペムブロリズマブ最適使用推進ガイドラインに基づく)

<標準プロトコール>



カペシタピン: 14日間(分2・夕開始)連日経口投与、7日間休薬

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m²

<使用薬剤・投与量>

カペシタピン

C法: 1000mg/m²

体表面積	1回用量 / 1日用量
1.36m ² 未満	1,200mg(4錠)/回 / 2,400mg(8錠)/日
1.36~1.66m ² 未満	1,500mg(5錠)/回 / 3,000mg(10錠)/日
1.66~1.96m ² 未満	1,800mg(6錠)/回 / 3,600mg(12錠)/日
1.96m ² 以上	2,100mg(7錠)/回 / 4,200mg(14錠)/日

朝・夕
2回

オキサリプラチン 130mg/m² ⇨ mg

ペムブロリズマブ 200mg/body ⇨ 200 mg

<治療計画>

切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 治療に対して不応または不耐まで

主治医

指導医

<注意点、副作用>